

## Consentimiento de Inducción/Incremento del Trabajo de Parto

Yo, \_\_\_\_\_, autorizo al Dr. \_\_\_\_\_ o a mi designada(o) a realizar un incremento en la inducción del trabajo de parto. La inducción del trabajo de parto es el uso de medicamentos u otros métodos para llevar a cabo (inducir) el trabajo de parto y el nacimiento de su bebé. El incremento del trabajo de parto es el uso de medicamentos u otros métodos para aumentar la frecuencia y/o la fuerza de las contracciones, después de la aparición del trabajo de parto espontáneo, cuando no se está logrando un progreso esperado.

### Beneficios de la Inducción del Trabajo de Parto:

Para algunos embarazos, tener el bebé es más seguro para usted y su bebé que continuar el embarazo. Su proveedor puede necesitar inducir su trabajo de parto si usted no ha comenzado el trabajo de parto por su cuenta o si tiene problemas que presentan un riesgo para usted y/o su bebé.

### Razones de las inducciones de parto:

- Pasada la Fecha Probable de Parto (más de 40 semanas)
- Problemas médicos que pueden dañar al bebé o a la madre
- Presión arterial alta durante el embarazo
- La bolsa de agua se ha roto
- La inducción electiva puede ser apropiada después de 39 semanas
- Puede haber otras razones para la inducción

### Beneficios del Incremento del Trabajo de Parto:

Para algunos trabajos de parto, es posible que no progrese como se esperaba. A veces, las contracciones se ralentizan, se detienen o se vuelven tan irregulares que el médico puede recomendar un incremento.

### Tipos de Inducción/ Incremento del Trabajo de Parto:

- Si el cuello uterino no está listo para el trabajo de parto, podemos usar ciertos medicamentos para suavizarlo y que sea capaz de estirarse para el trabajo de parto. Las prostaglandinas son medicamentos que se pueden utilizar para preparar o madurar el cuello uterino para el trabajo de parto. Las prostaglandinas se insertan en la vagina o se toman por vía oral.
- La oxitocina (Pitocina) es un medicamento utilizado para inducir/incrementar el trabajo de parto. Este es un medicamento que hace que el útero se contraiga. Cuando la oxitocina se utiliza para inducir el trabajo de parto o hacer que las contracciones sean más fuertes, se administra al torrente sanguíneo a través de una línea intravenosa (IV) en el brazo. Una bomba conectada a la línea IV controla la cantidad que se le administra. El personal vigilará cuidadosamente a usted y a su bebé mientras esté recibiendo el medicamento.
- Otro método de maduración cervical que se puede utilizar es la colocación de un globo lleno de líquido dentro del cuello uterino. Esto se deja en su lugar para proporcionar una presión suave para que el cuello uterino se abra.
- Si aún no se ha roto, el médico puede romper la bolsa de agua (saco amniótico) para iniciar las contracciones o para hacerlas más fuertes.

### Riesgos potenciales de inducción/incremento del trabajo de parto:

- La inducción puede provocar un trabajo de parto más prolongado y una mayor probabilidad de la necesidad del uso de instrumentos, como fórceps o un extractor.
- Experimentar demasiadas contracciones del útero, que pueden causar inestabilidad fetal que requiere un parto de emergencia.



